

Care Following Topical Skin Adhesive

- Topical skin adhesive film is a sterile, liquid skin adhesive that holds wound edges together. The film will actually remain in place for up to 5 to 10 days, and then naturally fall off.
- The following instructions will provide instructions for proper care for your wound while it is healing.

Check Wound Appearance

- Some swelling, redness, and pain are common with all wounds and normally will go away as the wound heals. If swelling, redness or pain increases or if the wound feels warm to touch, contact your health care practitioner. Also contact your health care practitioner if the wound edges reopen or separate.

Replace Bandages

- If your wound is bandaged, keep the bandage dry.
- Replace the dressing daily until the adhesive film has fallen off or if the bandage should become wet, unless otherwise instructed by your health care practitioner.
- When changing the dressing, do not place tape directly over the topical skin adhesive film, because removing the tape later may also remove the film.

Avoid Topical Medications

- Do not apply liquid or ointment medications or any other product to your wound while the topical skin adhesive film is in place. These may loosen the film before your wound is healed.

Soins après un adhésif cutané topique

- La pellicule adhésive cutanée topique est une colle cutanée liquide stérile qui maintient les deux bords d'une plaie l'un contre l'autre. La pellicule reste en place de 5 à 10 jours, puis tombe naturellement.
- Les consignes suivantes expliquent comment bien prendre soin de votre plaie pendant qu'elle guérit.

Vérifiez l'apparence de la plaie

- Un peu d'enflure, de rougeur et de douleur sont normales pour toutes les plaies et disparaissent normalement à mesure que la plaie guérit. Si l'enflure, la rougeur ou la douleur augmentent ou si la plaie est chaude au toucher, communiquez avec votre fournisseur de soins de santé. Communiquez aussi avec votre fournisseur de soins de santé si les bords de la plaie se séparent ou s'écartent.

Remplacez le pansement

- Si votre plaie est couverte d'un pansement, tenez votre pansement sec.
- Remplacez le pansement tous les jours jusqu'à ce que la pellicule adhésive tombe ou si le pansement devient mouillé, à moins d'indication contraire de votre fournisseur de soins de santé.
- Quand vous changez votre pansement, ne placez pas le ruban adhésif directement sur la pellicule adhésive cutanée topique, parce qu'enlever le ruban adhésif plus tard pourrait aussi enlever la pellicule adhésive.

Évitez les médicaments topiques

- N'appliquez pas de médicaments liquides, onguents ou autres produits à votre plaie pendant que l'adhésif cutané topique est en place. Ces produits peuvent décoller la pellicule avant que la plaie soit guérie.



For more information/Pour de plus amples renseignements :

Health Links-Info Santé - 1-888-315-9257
or visit/ou visiter : www.southernhealth.ca

Care Following Topical Skin Adhesive CLI.4510.SG.003.SD.01 May 15, 2017