


Fiche de renseignements sur le cathéter central inséré par voie périphérique (CCIP)

Remarque : Ces renseignements vous sont fournis à titre informatif et éducatif seulement. Ils ne constituent en aucun cas un avis ou un traitement médical.

Qu'est-ce qu'un CCIP?

Un CCIP est un long tube de plastique fin et flexible introduit dans le bras par une grosse veine, près du pli du coude ou juste au-dessus. L'extrémité du tube est insérée dans la plus grosse artère de votre corps (l'aorte abdominale), au-dessus de votre cœur. Le CCIP est muni de sites d'injections au niveau du bras.



À quoi sert le CCIP?

Le CCIP est utilisé pour administrer des traitements intraveineux sur une longue période – généralement de plus de six jours. Il sera retiré lorsque vous n'en aurez plus besoin. Le CCIP peut rester en place pendant 6 mois, voire 1 an ou plus, au besoin. Il est aussi utilisé pour :

- les prélèvements sanguins;
- l'administration intraveineuse de solutés;
- l'administration intraveineuse de médicaments et de traitements chimiothérapeutiques;
- l'injection de sang ou de produits sanguins;
- l'injection intraveineuse d'éléments nutritifs.

Comment le CCIP est-il inséré?

- Buvez beaucoup de liquides le jour même de la pose du CCIP pour aider à augmenter la taille de vos veines.
- La pose du CCIP sera effectuée par un professionnel de la santé, par exemple un membre du personnel infirmier. La procédure prend environ une heure. Avant de commencer, le personnel vous expliquera la procédure, répondra à vos questions et vous demandera votre consentement. On vous demandera ensuite de vous allonger sur un lit ou une civière. Les draps et la jaquette utilisés auront été stérilisés. L'artère sera localisée par échographie, puis une petite aiguille sera introduite dans la veine pour fixer le cathéter. La position du cathéter est vérifiée par électrocardiogramme (É.C.G.) ou par radiographie avant l'utilisation.

Quelles sont les complications potentielles?

Votre équipe de soins de santé veillera à faire ce qu'il faut pour prévenir les complications et réagira rapidement si jamais elles devaient survenir. Les complications les plus courantes associées au CCIP sont :

Fiche de renseignements sur le cathéter central inséré par voie périphérique (CCIP)

- la formation d'ecchymoses au point d'entrée du CCIP;
- le développement d'infections;
- la formation de caillots sanguins dans le bras;
- l'obstruction du CCIP;
- le déplacement du CCIP.

Comment le personnel doit-il entretenir le CCIP?

- Le CCIP sera tenu en place par un dispositif spécial appelé StatLock. **Très important** : il ne faut pas tirer sur le CCIP ni sur le tube intraveineux.
- Le pansement transparent doit être changé tous les 7 jours ou dès qu'il devient sale ou mouillé, ou qu'il se met à décoller. Le pourtour du pansement doit être étanche pour le maintenir propre et sec.
- Le personnel doit vérifier si vous présentez des signes d'infection, comme des rougeurs, de l'enflure ou du pus, à l'endroit où le CCIP s'insère dans la peau.
- Entre les traitements, le CCIP doit être irrigué au moyen d'une solution au moins une fois par semaine, afin de le garder en bon état.

Comment dois-je entretenir le CCIP?

- Lavez toujours vos mains avant de toucher au tube.
- Vous ne pourrez pas nager ni immerger le bras de votre CCIP dans l'eau.
- Vous devrez porter un protecteur sur votre bras avant de prendre un bain ou une douche pour éviter de mouiller votre pansement.
- Examinez votre CCIP et votre pansement au moins une fois par jour pour vous assurer qu'ils sont propres, secs et bien en place, et que la longueur visible du tube à l'extérieur de votre bras demeure la même.
- Soyez attentif aux signes d'infection, tels que les rougeurs, l'enflure et la présence de pus au point d'entrée.
- De la douleur dans le bras de votre CCIP pourrait être un signe d'infection ou de caillot sanguin.

Vous devez consulter votre fournisseur de soins de santé immédiatement si :

- vous constatez des signes d'infection;
- votre pansement est mouillé ou sale, s'il décolle ou s'il y a des fluides en dessous du pansement;
- le bras de votre CCIP est douloureux, chaud, rouge ou enflé;
- vous vous sentez malade, avez de la difficulté à respirer ou de la fièvre.

Vous recevrez des instructions particulières à cet effet. Dans le doute, rendez-vous au service d'urgence le plus près de vous.

Fiche de renseignements sur le cathéter central inséré par voie périphérique (CCIP)

Instructions particulières :

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à votre fournisseur de soins de santé pendant la procédure. Veuillez prendre quelques minutes pour nous dire comment votre procédure s'est passée en remplissant le court sondage accessible par le code QR ci-dessous.

Patient Survey - Tell Us What You Think!

